

ULTRACENT

460 EC



Fungizid

ULTRACENT™ ist ein hochwirksames Fungizid mit systemischen Eigenschaften und protektiver sowie kurativer Wirkung zur Bekämpfung von Halmbruch und Mehltau in Getreide.

Wirkstoff: 300 g/l Spiroxamine
160 g/l Prothioconazol

Formulierung: Emulgierbares Konzentrat (EC)

Anwendung nur durch berufliche Anwender zulässig.

Verpackung nicht wiederverwenden.

Vor Gebrauch beiliegendes Merkblatt lesen.

VOR FROST SCHÜTZEN.
VOR GEBRAUCH GUT SCHÜTTELN.



Vertrieb und Zulassungsinhaber:
JT Agro Europe sp. z o.o.,

Gate A, Aleja Grunwaldza 472,
80-309 Gdańsk, Poland
www.jtcrop.com
info@jtcrop.com

4 x 5 L e



Angaben zur Einstufung und Kennzeichnung gemäß Verordnung (EG) Nr. 1272/2008

ULTRACENT™

UFI: AV23-PONX-000Q-XNR8

Wirkstoff: 300 g/l Spiroxamine, 160 g/l Prothioconazol
Formulierung: Emulgierbares Konzentrat (EC)

Gefahrenhinweise (H-Sätze):
(H302) **Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.**
(H315) **Verursacht Hautreizungen.**
(H319) **Verursacht schwere Augenreizung.**
(H332) **Gesundheitsschädlich bei Einatmen.**
(H335) **Kann die Atemwege reizen.**
(H361d) **Kann vermutlich das Kind im Mutterleib schädigen.**
(H373) **Kann die Augen schädigen bei längerer oder wiederholter Exposition.**
(H410) **Sehr giftig für Wasserorganismen mit langfristiger Wirkung.**

Sicherheitshinweise (P-Sätze):
(P101) Ist ärztlicher Rat erforderlich, Verpackung oder Kennzeichnungsetikett bereithalten.
(P102) Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen.
(P260) Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol nicht einatmen.
(P264) Nach Gebrauch Hände gründlich waschen.
(P270) Bei Gebrauch nicht essen, trinken oder rauchen.
(P271) Nur im Freien oder in gut belüfteten Räumen verwenden.
(P280) Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
(P302+P352) BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser und Seife abwaschen.
(P305+P351+P338) BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Eventuell vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
(P308+P313) BEI Exposition oder falls betroffen: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
(P391) Verschüttete Mengen aufnehmen.
(P403+P233) An einem gut belüfteten Ort aufbewahren. Behälter dicht verschlossen halten.
(P405) Unter Verschluss aufbewahren.
(P501) Inhalt/Behälter in Übereinstimmung mit örtlichen Vorschriften entsorgen.

Weitere Kennzeichnungselemente:
(EUH 208-0040) Enthält Spiroxamin. Kann allergische Reaktionen hervorrufen.
(EUH 401) Zur Vermeidung von Risiken für Mensch und Umwelt die Gebrauchsanleitung einhalten.

JT Agro Europe sp. z o.o. · Gate A, Aleja Grunwaldza 472 · 80-309 Gdańsk, Poland



ERSTE-HILFE MASSNAHMEN:

Allgemeine Maßnahmen:

Bei Unfall, Exposition oder Unwohlsein sofort Arzt hinzuziehen. Ist ärztlicher Rat erforderlich, Verpackung oder Etikett des Produktes bereithalten. Ersthelfer: Auf Selbstschutz achten!

Nach Einatmen:

Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.

Nach Hautkontakt:

Mit viel Wasser abwaschen. Kontaminierte Kleidung ausziehen.

Nach Augenkontakt:

Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Eventuell vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.

UN 3082

V.2026.01

ULTRACENT™ = reg Marke der JT Agro Limited
Herstellungsdatum und Charge: aus technischen Gründen an anderer Stelle.